



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Liste des espèces indigènes de haies

Buissons épineux

Nom commun	Nom latin	Hauteur	Milieux	Humidité	Ensoleillement	Croissance	Remarque
Aubépine	<i>Crataegus</i> sp.	4 – 5 m	Buissons, haies, lisières, clairières ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Mi-ombragé	Lente	Sujet au feu bactérien : plantation seulement autorisée à plus de 1000m d'altitude dans la forêt
Eglantier	<i>Rosa canina</i>	3 m	Haies, lisières, amas de pierres ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Moyenne	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fruits et fleurs mellifères
Epine-Vinette	<i>Berberis vulgaris</i>	3 m	Broussailles, haies, rocailles ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Sec	Ombagé	Lente	Peut abriter des ravageurs de céréales
Groseillier à maquereau	<i>Ribes uva-crispa</i>	0.6 – 1.5 m	Haies, lisières, rocailles ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fruits
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>	3 m	Haies, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Moyenne	Mi-ombragé	Lente	Source de nourriture pour les oiseaux
Prunelier	<i>Prunus spinosa</i>	3 m	Haies, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Moyenne	Ensoleillé	Lente	Produit des fruits, des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux
Rose des champs	<i>Rosa arvensis</i>	1 m	Forêts, lisières, haies ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Source de nourriture pour les oiseaux
Rosier à fleurs en corymbe	<i>Rosa corymbifera</i>	1 m	Lisières, buissons, amas de pierres ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Moyenne	Mi-ombragé	Moyenne	Source de nourriture pour les oiseaux
Rosier églantier	<i>Rosa rubiginosa</i>	0.5 – 3 m	Buissons, prés secs ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Moyenne	Ensoleillé	Rapide	Source de nourriture pour les oiseaux
Rosier tomenteux	<i>Rosa tomentosa</i>	1 – 1.5 m	Buissons, forêts de feuillus ; sols secs ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Moyenne	Mi-ombragé	Moyenne	Source de nourriture pour les oiseaux

Buissons bas

Nom commun	Nom latin	Hauteur	Milieux	Humidité	Ensoleillement	Croissance	Remarque
Bourdaine	<i>Frangula alnus</i>	1-3 m	Aulnaies, haies, marais ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Planter uniquement dans les milieux humides
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>	2 m	Forêts, lisières, buissons, haies ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Humide	Mi-ombragé	Moyenne	Peut abriter des ravageurs de cerisiers
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	4 m	Haies, forêts, buissons, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Humide	Mi-ombragé	Lente	Assez compétitif, produit des fleurs mellifères
Coronille	<i>Hippocrepis emerus</i>	0.5 – 2 m	Forêts claires, buissons, pierriers ; favorise plutôt les endroits secs et chauds ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Sec	Mi-ombragé	Lente	Enrichit le sol en azote
Fusain d'Europe	<i>Euonymus europaeus</i>	1 – 5 m	Haies, forêts, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Mi-ombragé	Lente	Source de nourriture pour les oiseaux
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	5 m	Taillis, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Moyenne	Mi-ombragé	Rapide	Assez compétitif, peut abriter des ravageurs de vergers, produit des fruits et des fleurs mellifères
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	7 m	Haies, buissons ; souvent cultivé ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fruits et des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux
Sureau rouge	<i>Sambucus racemosa</i>	4 m	Haies, pierriers ; de 700 m à 1800 m (parfois aussi en plaine)	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fruits et des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux
Troène vulgaire	<i>Ligustrum vulgare</i>	4 m	Lisières, buissons ; favorise plutôt les endroits chauds ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m)	Moyenne	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>	5 m	Haies, buissons, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Sec	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	4 m	Haies, forêts riveraines, lisières, buissons ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux

Arbustes

Nom commun	Nom latin	Hauteur	Milieux	Humidité	Ensoleillement	Croissance	Remarque
Aulne blanc	<i>Alnus incana</i>	15 m	Rives, forêts humides ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Très humide	Mi-ombragé	Rapide	Source de nourriture pour les oiseaux, bois de feu
Aulne noir	<i>Alnus glutinosa</i>	20 m	Rives, forêts humides ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Très humide	Mi-ombragé	Rapide	Source de nourriture pour les oiseaux, bois de feu
Bouleau	<i>Betula pendula</i>	25 m	Zones riveraines, tourbières, forêts ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Moyenne	Ensoleillé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	20 m	Forêts ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m)	Humide	Ombagé	Rapide	Faible valeur écologique
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>	15 m	Forêts, haies ; souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Moyenne	Mi-ombragé	Lente	Produit des fleurs mellifères et du fourrage
Saule Marsault	<i>Salix caprea</i>	9 m	Forêts riveraines, clairières, lisières, gravières, décombres ; de la plaine jusqu'à 1800 m (parfois au-dessus de 1800 m)	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fleurs mellifères et du bois de feu
Merisier	<i>Prunus avium</i>	25 m	Lisières, forêts, haies ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fruits et des fleurs mellifères
Merisier à grappes	<i>Prunus padus</i>	10 m	Forêts riveraines, lisières, sols humides ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Ombagé	Rapide	Produit des fruits et des fleurs mellifères
Saule pourpré	<i>Salix purpurea</i>	1 – 6 m	Rives, buissons, souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Ensoleillé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	20 m	Rives, forêts riveraines ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Très humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fleurs mellifères et du bois de feu
Sorbier des oiseaux	<i>Sorbus aucuparia</i>	15 m	Forêts ; de 700 à 1200 m	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Sujet au feu bactérien : plantation seulement autorisée à plus de 1000m d'altitude dans la forêt

Arbres

Nom commun	Nom latin	Hauteur	Milieux	Humidité	Ensoleillement	Croissance	Remarque
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	50 m	Forêts humides ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m)	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit de la nourriture pour les oiseaux
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	28 m	Pentes sèches et pierreuses, forêts ; favorise plutôt les endroits secs ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m)	Sec	Mi-ombragé	Moyenne	Produit de la nourriture pour les oiseaux
Erable plane	<i>Acer platanoides</i>	25 m	Forêts de feuillus, aulnaies ; souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Ombagé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Erable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30 m	Forêts de plaine et de montagnes, haies, pâturages ; souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Humide	Ombagé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Frêne	<i>Fraxinus excelsior</i>	25-40 m	Forêts humides, haies ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Mi-ombragé	Rapide	Tendance à l'envahissement, faible valeur écologique
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	40 m	Forêts ; de 700 à 1200 m (parfois en plaine et de 1200 à 1800 m)	Humide	Très ombragé	Lente	
Orme de montagne	<i>Ulmus glabra</i>	30 m	Forêts, parcs	Humide	Ombagé	Rapide	
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i>	35 m	Forêts riveraines, parcs, généralement cultivé ou subspontané ; en plaine	Humide	Ensoleillé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i>	30 m	Forêts riveraines, parcs, souvent cultivé ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Très humide	Mi-ombragé	Rapide	Produit des fleurs mellifères
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>	30 m	Forêts, pentes broussailleuses ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Moyenne	Ombagé	Lente	Produit des fleurs mellifères
Tilleul à larges feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	40 m	Forêts ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Humide	Ombagé	Lente	Produit des fleurs mellifères
Tremble	<i>Populus tremula</i>	20 m	Forêts, lisières, buissons ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Humide	Ensoleillé	Rapide	Produit des fleurs mellifères

Conifères / à feuillage persistant :

Les conifères sont plus adaptés à des altitudes supérieures à 1000 m.

Nom commun	Nom latin	Hauteur	Milieux	Humidité	Ensoleillement	Croissance	Remarque
Épicéa	<i>Picea abies</i>	50 m	Forêts à sol acide ; de 700 à 1800 m (parfois aussi en plaine)	Humide	Très ombragé	Rapide	Faible valeur écologique
Genévrier	<i>Juniperus communis</i>	3 m	Forêts, pentes sèches, pierriers ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Sec	Ensoleillé	Lente	Peut abriter des ravageurs de poiriers
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	10 m	Forêts, surtout hêtraies, chênaies, endroits non exposés ; de la plaine jusqu'à 1200 m	Moyenne	Ombragé	Lente	Source de nourriture pour les oiseaux
If	<i>Taxus baccata</i>	20 m	Pentes boisées, ombragées, gorges; souvent cultivé ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Moyenne	Ombragé	Lente	Source de nourriture pour les oiseaux
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	40 m	Forêts, rochers, alluvions, souvent pionnier sur sols maigres ; de la plaine jusqu'à 1800 m	Moyenne	Ensoleillé	rapide	Faible valeur écologique
Sapin	<i>Abies alba</i>	60 m	Forêts à sol profond ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m)	Très humide	Très ombragé	Lente	Faible valeur écologique



Liste des néophytes envahissantes et potentiellement envahissantes de Suisse

La liste contient les plantes vasculaires selon l'annexe de la publication 'Espèces exotiques en Suisse' (OFEV, [lien publication](#)).

1. Liste des néophytes envahissantes

	Nom scientifique	Nom FR	Jura	Plateau	Versant N Alpes	Alpes centrales O	Alpes centrales E	Versant S Alpes	Habitus	Annexe 2 (ODE)
1	<i>Acacia dealbata</i> Link	Mimosa blanchâtre		*	*			**	Ba	
2	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante	**	***	**	***	**	***	Ba	
3	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'armoise	**	***	**	**	**	***	Kr	X
4	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Amorphe buissonnante	*	*	*		*	**	St	
5	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Armoise des frères Verlot	**	***	**	**	*	***	Kr	
6	<i>Asclepias syriaca</i> L.	Asclépiade de Syrie	*	**	*	*	*	*	Kr	
	<i>Aster novi-belgii</i> aggr.	Aster de la Nouvelle-Belgique	*	**	**	*	*	*	Kr	
7	<i>Aster xsalignus</i> Willd. [traité comme aggrégat]	Aster à feuilles de saule	/	/	/	/	/	/	Kr	
8	<i>Aster xversicolor</i> Willd. [traité comme aggrégat]	Aster versicolore	/	/	/	/	/	/	Kr	
9	<i>Aster lanceolatus</i> Willd. [traité comme aggrégat]	Aster lancéolé	/	/	/	/	/	/	Kr	
10	<i>Aster novi-belgii</i> L. [traité comme aggrégat]	Aster de la Nouvelle-Belgique	/	/	/	/	/	/	Kr	
11	<i>Aster parviflorus</i> Nees [traité comme aggrégat]	Aster de Tradescant	/	/	/	/	/	/	Kr	
12	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	Mûrier de Chine		*	*			*	Ba	
13	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddléia de David	***	***	***	***	***	***	St	
14	<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	***	***	**	***	**	*	Kr	
15	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	Bourreau des arbres asiatique		*	*			*	Li	
16	<i>Cornus sericea</i> L.	Cornouiller soyeux	**	***	***	*	*	*	St	
17	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Cotonéaster horizontal	**	***	**	**	*	*	St	
18	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Elodée du Canada	**	***	***	**	*	*	Wa	
19	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St. John	Elodée de Nuttall	*	***	***	*	*	**	Wa	X
20	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Vergerette annuelle	***	***	***	***	***	***	Kr	
21	<i>Galega officinalis</i> L.	Galéga officinal	*	***	*	*		*	Kr	
22	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.	Glycérie striée	*	**	**		*	*	Gr	
23	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambour	*	**	*	*	*	**	Kr	
24	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Berce du Caucase	**	***	***	***	***	***	Kr	X
25	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Impatiente glanduleuse	***	***	***	***	***	***	Kr	X
26	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss	Grand lagarosiphon		*	*			*	Wa	
27	<i>Lonicera henryi</i> Hemsl.	Chèvrefeuille de Henry	*	***	**			*	Li	
28	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Chèvrefeuille du Japon	*	***	*	*		***	Li	
29	<i>Ludwigia xkentiana</i> E. J. Clement	Ludwigie de Kent		**					Wa	X
30	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie à grandes fleurs		*					Wa	X
31	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Lupin à folioles nombreuses	*	**	**	***	***	**	Kr	
32	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Myriophylle aquatique		**	*				Wa	
33	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx.	Myriophylle à feuilles de deux formes		*					Wa	
	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr.	Vigne vierge à cinq folioles	*	**	*	*	*	**	Li	
34	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch	Vigne vierge commune	**	***	**	**	*	**	Li	
35	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vigne vierge à cinq folioles	*	**	*	*	*	**	Li	
36	<i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C. Rivière	Bambou doré		*	*			*	Gr	
37	<i>Polygonum polystachyum</i> Meisn.	Renouée à épis nombreux	*	**	**	*	*	**	Kr	X
38	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise	***	***	***	***	*	***	St	
39	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Merisier tardif	*	**	*	*		**	Ba	
40	<i>Pseudosasa japonica</i> (Steud.) Nakai	Bambou du Japon		*	*			*	Gr	
41	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	Puéraire hérissée	*	*				**	Li	
	<i>Reynoutria japonica</i> aggr.	Renouée	***	***	***	**	***	***	Kr	X
42	<i>Reynoutria xbohemica</i> Chrtk & Chrtková	Renouée de Bohême	**	**	*	*	*	**	Kr	X
43	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	***	***	***	***	**	***	Kr	X
44	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai	Renouée de Sakhaline	*	**	*	*	**	*	Kr	X



Liste des néophytes envahissantes et potentiellement envahissantes de Suisse

La liste contient les plantes vasculaires selon l'annexe de la publication 'Espèces exotiques en Suisse' (OFEV, [lien publication](#)).

	Nom scientifique	Nom FR	J	P	VNA	ACO	ACE	VSA	Habitus	ODE
45	<i>Rhus typhina</i> L.	Sumac	**	***	***	***	***	***	St	X
46	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier	***	***	***	***	**	***	Ba	
47	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	Ronce d'Arménie	***	***	***	**	**	**	Li	
48	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	Framboisier du Japon	*	**	*			**	Li	
49	<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.	Orpin bâtard	**	***	**	*	*	*	Su	
50	<i>Sedum stoloniferum</i> S. G. Gmel.	Orpin stolonifère	*	**	**	*		*	Su	
51	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Séneçon sud-africain	***	***	***	***	***	**	Kr	X
52	<i>Sicyos angulatus</i> L.	Sicyos anguleux	*					**	Li	
	<i>Solidago canadensis</i> aggr.	Solidage du Canada	***	***	***	***	***	**	Kr	X
53	<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada	***	***	***	***	**	***	Kr	X
54	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Solidage géant	***	***	***	**	**	***	Kr	X
55	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze	Arbre à la gale						*	Li	
56	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Palmier chanvre	*	***	**	*	*	***	Ba	

2. Liste des néophytes potentiellement envahissantes

	Nom scientifique	Nom FR	J	P	VNA	ACO	ACE	VSA	Habitus	ODE
1	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Abutilon de Théophraste	*	**	*			*	Kr	
2	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Kiwi	*	*	*	*		**	Li	
3	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	Akébie à cinq feuilles		*	*			*	Li	
4	<i>Ambrosia trifida</i> L.	Ambrosie trifide	*	*					Kr	
5	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	Aralie élevée		**	*	*			St	
6	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolla fausse filicule		*					Wa	
7	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott	Bassie à balais	*	*		**	*		Kr	
8	<i>Bromus riparius</i> Rehmman	Brome des rivages	*	**	**	*	*	*	Gr	
9	<i>Chorispura tenella</i> (Pall.) DC.	Chorispura délicate		*		**	*		Kr	
10	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Souchet comestible	*	***	*		*	**	Gr	
11	<i>Diospyros lotus</i> L.	Plaqueminier lotier	*	*	*			**	Ba	
12	<i>Elodea densa</i> (Planch.) Casp.	Elodée dense		*	*	*		*	Wa	
13	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Vergerette mucronée	*	**	**		*	**	Kr	
14	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	Fusain de fortune	*	*	*			*	Li	
15	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.	Impatiente bicolore	*	**	*	**	*	**	Kr	
16	<i>Lonicera pileata</i> Oliv.	Chèvrefeuille toujours vert rampant	**	***	**	*		*	St	
17	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	Roseau de Chine, Eulalie	*	**	*	*		*	Gr	
18	<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	Cheveux d'Ange	*	**	*	*		*	Gr	
19	<i>Oenanthe javanica</i> DC.	Persil japonais						*	Wa	
20	<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.	Figuier d'Inde	*	*	*	**		*	Su	
21	<i>Opuntia phaeacantha</i> Engelm.	Oponce à épines sombres		*	*	**		*	Su	
22	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Paulownia	*	***	**	**	*	***	Ba	
23	<i>Phytolacca americana</i> L.	Raisin d'Amérique	*	**	*	*	*	***	Kr	
24	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	Rosier à fleurs nombreuses	*	***	*			*	St	
25	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Sagittaire à larges feuilles	*	**	*	*	*	*	Wa	
26	<i>Solanum carolinense</i> L.	Morelle de Caroline		*				*	Kr	
27	<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.	Solidage à feuilles de graminée		**	*				Kr	(X)
28	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgho d'Alep	*	**	**	*	*	**	Gr	
29	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Sporobole d'Inde	*	**	*			**	Gr	
30	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	Symphorine blanche	**	***	**	*	*	*	St	
31	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Viorne rugueuse	**	***	**	*	*	*	St	
32	<i>Vitis riparia</i> aggr.	Vigne des rivages		*		*		*	Li	
	<i>Vitis riparia</i> Michx. [traité comme aggrégat]	Vigne des rivages	/	/	/	/	/	/	Li	

Liste des néophytes envahissantes et potentiellement envahissantes de Suisse

La liste contient les plantes vasculaires selon l'annexe de la publication 'Espèces exotiques en Suisse' (OFEV, [lien publication](#)).

Liste des néophytes envahissantes et potentiellement envahissantes pas (encore) présentes en CH

Espèces qui ne sont pas encore présentes en Suisse ou qui ont été éradiquées grâce à des mesures de lutte, mais dont la présence ou la réapparition en Suisse ne sont pas à exclure (liste non exhaustive).

Nom scientifique		Nom FR	Jura	Plateau	Versant N Alpes	Alpes centrales O	Alpes centrales E	Versant S Alpes	Habitus	Annexe 2 (ODE)
1	<i>Ambrosia confertiflora</i> DC.	Ambrosie à feuilles molles	—	—	—	—	—	—	Kr	
2	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	Ambrosie à épis glabres	—	—	—	—	—	—	Kr	
3	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	Cabomba, Éventail de Caroline	—	—	—	—	—	—	Wa	
4	<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne	Crassule de Helm	—	—	—	—	—	—	Wa	X
5	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. & A. Gray	Concombre sauvage	—	—	—	—	—	—	Li	
6	<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc. [Syn. H. scandens]	Houblon du Japon	—	—	—	—	—	—	Li	
7	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Hydrocotyle fausse renoncule	—	—	—	—	—	—	Wa	X
8	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P. H. Raven	Jussie rampante	—	—	—	—	—	—	Wa	X
9	<i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Arechav.	Cheveux d'Ange d'Argentine	—	—	—	—	—	—	Gr	
10	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Herbe aux écouvillons d'Afrique	—	—	—	—	—	—	Gr	
11	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	Renouée perfoliée	—	—	—	—	—	—	Li	
12	<i>Salvinia molesta</i> D. S. Mitch. [§]	Salvinie géante	—	—	—	—	—	—	Wa	

[§] Il a été supposé que l'espèce avait été éradiquée lors de la mise à jour de la liste, mais elle est réapparue en 2022.

Explications

- Liste des néophytes envahissantes : Espèces dont il est prouvé qu'elles causent des dommages à l'environnement[§]
- Liste des néophytes potentiellement envahissantes : Espèces dont il faut supposer qu'elles causent ou causeront des dommages à l'environnement[§]

[§] Les dommages se rapportent aux biens protégés en vertu de la législation sur la protection de l'environnement ; les espèces qui causent exclusivement des dommages dans les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, par exemple, ne figurent pas sur cette liste (voir p. ex. OSaVé, OFE).

Présence

- * 1 - 50 observations (état déc. 2021)
- ** 51 - 500 observations (état déc. 2021)
- *** > 500 observations (état déc. 2021)

Link aux [régions biogéographiques](#) actuelles (2022).

Habitus

- Ba** Arbre
- Gr** "Graminéen"
- Kr** Herbacée
- Li** Liane
- St** Buisson
- Su** Succulent
- Wa** Plante aquatique

Annexe 2 (ODE)

X: Espèce interdite de l'Annexe 2 de Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE (art. 15, al. 2, [lien](#)).